

Inflammation des glandes sébacées

Esther van Praag, Ph.D.

L'inflammation des glandes sébacées est une maladie auto-immune génétique, qui peut affecter les lapins. Les premiers symptômes sont proches de ceux d'une allergie de la peau: inflammation des glandes sébacées avec destruction progressive des glandes et des follicules pileux adjacents. Avec le temps, la croissance des poils est stoppée et une alopecie se développe. Des infections bactériennes secondaires sont souvent observées.

Diagnostic

L'inflammation des glandes sébacées est souvent diagnostiquée comme allergie de la peau et est alors traitée de façon inappropriée. Les autres problèmes cutanés ne sont souvent pris en considération que lorsque le traitement contre l'allergie échoue et n'apporte aucune amélioration.

Il est ainsi recommandé de faire une biopsie de la peau et de faire analyser l'échantillon par un dermatopathologiste.

Traitement

Il n'existe pas de traitement contre l'inflammation des glandes sébacées, à l'exception de bons soins. Chez le chien, le traitement consiste à le laver avec des produits de lessive forts deux fois par semaine/mois, à nettoyer la peau avec une solution de chlorhexiderme après le shampooing et à enduire la peau avec une solution huileuse après le bain. Ceci permet d'amollir les pellicules et "huile" la peau. Un brossage régulier permet également d'éliminer les pellicules, qui sont une source d'infections bactériennes secondaires.

Si une infection est observée, celle-ci doit être traitée avec des antibiotiques ou une crème antiseptique.

Les informations, photographies et illustrations contenues dans ces pages ne peuvent pas être reproduites ou publiées dans d'autres pages Internet, site Internet ou autres.

MAI 2005

