

## ***Resekcja ucha u królików (typu baranek)***

*Esther van Praag, Ph.D.*

*Tłumaczenie: Teresa Pyza, lek. wet. Dorota Pilich*

*Uwaga: ten plik zawiera zdjęcia które mogą być nieodpowiednie dla niektórych osób.*

Króliki mogą cierpieć na przewlekłą infekcję ucha. Króliki typu baranek są szczególnie predysponowane do chronicznego zakażenia ucha z powodu kształtu kanału słuchowego i zwisającej w dół małżowiny usznej utrudniającej dobrą wentylację. To prowadzi do nawracającej i przewlekłej infekcji ucha.




Często wypróbowuje się różne sposoby leczenia, których niepowodzenie doprowadza do nagromadzenia ropy i zatkania kanału słuchowego. To z kolei utrudnia lekom podawanym miejscowo do uszu kontakt z organizmami zakażającymi

ucho i ich eliminację. Rezultat jest taki, że infekcja nie może być właściwie leczona i stan pogarsza się, albo:

- jest leczona, ale następuje nawrót po kilku miesiącach
- doprowadza do zmian rozwojowych w uchu, takich jak owrzodzenie, albo wzrost guza lub polipa.

Pozioma resekcja ucha, zwana także „procedurą Zeppa” może być zastosowana jeśli nie występują żadne zmiany w poziomym kanale słuchowym. Celem tego zabiegu operacyjnego jest skrócenie długości





Kim Chilson

Resekcja ucha przeprowadzona przez dr B. Langhofer



kanału słuchowego aby ułatwić przepływ powietrza, drenaż i umożliwić lekom dotarcie do zainfekowanego miejsca. Zmiana temperatury i zmniejszenie wewnętrznej wilgotności prowadzi do zmniejszenia zakażenia bakteryjnego.

#### Zabieg operacyjny i opieka pooperacyjna

Zabieg chirurgiczny przebudowuje wejście kanału słuchowego przez usunięcie niewielkiej części skóry, chrząstki i kanału słuchowego, dzięki temu zostanie stworzone nowe „wejście” odsłaniające kanał poziomy.



Kim Chilson

Wygląd ucha 16 godzin po zabiegu

Podawanie antybiotyków i leków przeciwbólowych jest konieczne po zakończeniu zabiegu operacyjnego. Te ostatnie zredukują ból, który jak wiadomo spowalnia aktywność przewodu pokarmowego, opóźnia przyjęcie pokarmu i powrót do zdrowia u królików.

W miejscu zabiegu mogą pojawić się krwawe strupki pokryte wydzieliną z ucha.

Nie zaleca się usuwania ich do czasu zdjęcia szwów.

Zwykle mija następne parę miesięcy a nawet rok czasu zanim infekcja ucha jest kompletnie wyleczona.



### Podziękowania

Podziękowania dla Kim Chilson (USA) i dla dr B. Langhofer (FIRST Regional Animal Hospital, Chandler, Arizona – USA) za podzielenie się informacjami na temat techniki chirurgicznej resekcji ucha u królików oraz za zgodę na użycie zdjęć zabiegu chirurgicznego.

---

*Ta strona nie może być reprodukowana, publikowana na innej stronie internetowej, portalu internetowym, ani w jakimkolwiek innym miejscu.*

**CZERWIEC 2004**

*Tłumaczenie: 20 WRZESIEŃ 2005*

